

Voor- en nazorg behandeling met fillers

Vooraf

- Een behandeling met injectables kan onbewust erg spannend zijn en energie kosten. Wij raden je daarom aan om van te voren voldoende te eten, zodat je suikerspiegel niet te laag is.
- Als je zwanger bent of een antibiotica kuur volgt kun je niet behandeld worden.
- Een lipbehandeling kan een koortslip triggeren. Vaak last van een koortslip? Dan adviseren wij om een week voor de behandeling te beginnen met Profylaxe/Zovirax en dit voort te zetten tot minimaal 4 dagen na de behandeling.
- Als je bloedverdunners gebruikt kun je alleen behandeld worden als je 7 dagen van te voren stopt met inname in overleg met je huisarts.
- Als je een multivitamine gebruikt, let dan op de hoeveelheid vitamine E die erin zit. Indien die meer is dan 400 eenheden per dag, stop dan het gebruik 1 week voor je behandeling, vanwege het bloed verdunnende effect.
- Hetzelfde bloed verdunnende effect kan het gebruik van NSAID'S (bijv. Ibuprofen, Nurofen, Aleve) hebben. Gebruik dit bij voorkeur niet in de 48 uur voorafgaand aan uw behandeling. Paracetamol en Tramadol kunt u rustig blijven gebruiken.
- Alcohol maakt de kans op een bloeding of nabloeding groter. Daarom is het beter minstens 24 uur voor een behandeling geen alcohol te drinken.

Wat je kunt verwachten

- Het herstel van je huid zal vrij snel verlopen. Het uiteindelijke resultaat is een zachte, soepele huid. Na twee weken is het resultaat van de behandeling optimaal. Bij behandeling van de lippen kan dit proces iets langer duren.
- De kleine injecties kunnen een kortdurende pijn door de prik veroorzaken. Soms wordt bij het prikken een bloedvaatje geraakt waardoor een kleine bloeding kan ontstaan.
- De behandelde plek kan na de behandeling gezwollen en rood zijn. Dit trekt meestal na 24 uur weer weg.
- Het is normaal dat de behandelde plek tot enige dagen na de behandeling gevoelig is of enigszins 'stijf' aanvoelt.

Nazorg

- Je huid heeft nu vooral rust nodig. Probeer daarom contact met de behandelde plekken zo veel mogelijk te voorkomen, dus ook liever niet wrijven (om de filler niet naar ongewenst gebied te drijven).
- Het is niet nodig om de behandelde plek te masseren als dit niet is aangeraden door je arts.
- Geadviseerd wordt om tot 6 uur na de behandeling geen make-up te gebruiken
- Wij adviseren de eerste 24 uur geen alcohol te drinken.
- Het gebruik van pijnstillers als ibuprofen en aspirines wordt afgeraden vanwege het stimulerende effect daarvan op blauwe plekken en verkleuringen. Mocht je toch gebruik willen maken van pijnstillers, dan adviseren wij om paracetamol te gebruiken.
- Bescherm op de dag zelf, na afloop van de behandeling, je huid goed tegen de zon. Wij raden aan om zonnebrandcrème met Sunblock te gebruiken en je huid zo kort mogelijk (liever helemaal niet) bloot te stellen aan de zon. Draag zo nodig ook een goed beschermende zonnehoed.
- Ga de eerste week niet naar de sauna of intensief sporten.

In geval van vragen, problemen, pijn of koorts kun je contact opnemen tijdens kantooruren met: info@implacademy.nl of 0577 – 461981

Voor spoedgevallen en bij pijn of koorts buiten de normale kantoortijden kun je bellen met; 06 53 83 54 85